Qual o tratamento de uma recidiva de Granuloma Piogênico quando os dentes do local da lesão apresentam-se hígidos e vitais?

Não foram encontradas revisões sistemáticas comparando tratamentos para a recidiva de granulomas piogênicos bem como o tratamento dos dentes afetados. A literatura considera o granuloma piogênico como uma resposta tecidual exuberante a uma irritação local ou trauma, apresentando predileção pela região gengival. A irritação e inflamação gengival que resultam da má higiene oral podem ser considerados fatores predisponentes para o desenvolvimento desta lesão em muitos pacientes. A maioria dos estudos tem mostrado uma prevalência maior em mulheres, possivelmente devido aos efeitos vasculares provocados pelas alterações hormonais. O tratamento dos pacientes consiste em excisão cirúrgica conservadora subperióstica, devendo-se realizar análise histopatológica da lesão. Para as lesões gengivais, os dentes devem ser raspados, alisados e polidos a fim de remover os cálculos supra e sub gengivais, bem analisar a presença de outros fatores traumáticos locais. Algumas vezes, as lesões recidivam e são necessárias novas excisões cirúrgicas bem como nova intervenção para remoção dos fatores irritantes associados aos dentes envolvidos na lesão.

Documento gerado em 14-12-2023 06:26:08