**Quais as interações medicamentosas entre Prolopa® (levodopa + benserazida) e Fenitoína?**

A associação da Levodopa® (um dos componentes do medicamento Prolopa) e Fenitoina é considerada Risco C, com a indicação de monitorar a terapia devido as chances de aumento do risco de Síndrome neuroléptica maligna. A Prolopa® não interfere na ação da fenitoína, entretanto a fenitoina pode diminuir ou inibir o efeito terapêutico da Levodopa, tendo uma gravidade moderada(6). A conduta é monitorar a diminuição dos efeitos terapêuticos da Levodopa quando introduzida ou ajustadas doses da fenitoína ou aumento dos seus efeitos terapêuticos quando reduzidas ou retirada a fenitoína(6). A levodopa é o medicamento de primeira escolha para o tratamento sintomático de parkinsonianos; melhora a deficiência motora (Grau A2)(1,2). A fenitoína é uma droga antiepiléptica usada para reduzir a frequência de crises em pacientes com epilepsia (Grau A2)(3,4). A maioria dos pacientes em uso de medicação antiepilética podem apresentar necessidade de utilizar outras medicações ao longo dos anos. Dessa forma, o conhecimento das interações medicamentosas das drogas antiepilépticas é importante para a conduta ideal e adequada no tratamento das epilepsias e outras patologias associadas.

Documento gerado em 14-12-2023 06:26:08